

GUÍA DE ARIZONA A LAS VACUNAS REQUERIDAS PARA ENTRAR Guardería, Centro Preescolar o Head Start (Año Escolar 2024-2025)



- Los requisitos se muestran a continuación como se indica en [Arizona Administrative Code, R9-6-702](#), tabla 7.1 y la tabla 7.2
- Por favor revise el [Arizona Immunization Handbook for Schools and Child Care Programs](#) junto con [Vaccine Catch-Up Flowcharts & FAQs](#) para más información y detalles sobre los requisitos de vacunación escolar y exenciones.
- Las vacunas deben seguir los intervalos y edades mínimos del ACIP para ser válidas. Consulte la página 2-3 para obtener información sobre el intervalo mínimo y el programa de actualización.
- El período de gracia de 4 días solo se aplica a la edad y los intervalos mínimos de administración de la vacuna. Consulte el manual si tiene preguntas.

Vacuna	2-3 meses	4-5 meses	6-11 meses	12-14 meses	15-17 meses	18 meses – 59 meses
HepB Hepatitis B	1 dosis (Puede recibir la dosis 1 al nacer y la dosis 2 tan pronto como 1 mes de edad)	2 dosis	2 dosis (Puede recibir la dosis 3 a los 6 meses)	3 dosis (La dosis final debe administrarse a las 24 semanas de edad o más)	3 dosis	3 dosis documentadas (La dosis final debe administrarse a las 24 semanas de edad o más)
DTaP Difteria, tétanos y tos ferina	1 dosis	2 dosis	3 dosis	3 dosis	4 dosis	4 dosis documentadas
Hib <i>Haemophilus influenzae tipo b</i>	1 dosis	2 dosis	2-3 dosis	2-3 dosis (Se requiere una dosis de HIB a los 12 meses o después para todos los niños menores de 5 años.)	3-4 dosis (o 1 dosis a los 15 meses de edad o después)	3-4 dosis documentadas O 1 dosis a los 15 meses de edad o después
Polio IPV	1 dosis	2 dosis	2-3 dosis	3 dosis	3 dosis	3 dosis documentadas
MMR El sarampión, las paperas y la rubéola	No se da antes de los 12 meses de edad			1 dosis	1 dosis	1 dosis documentada
VAR Varicela (varicela)	No se da antes de los 12 meses de edad			1 dosis	1 dosis	1 dosis documentada
HepA Hepatitis A	No se da antes de los 12 meses de edad La serie de vacunas contra la hepatitis A (2 dosis) es REQUERIDO en el Condado de Maricopa para niños de 1 a 5 años de edad, pero se recomienda en todos los demás condados.			1 dosis	1 dosis	2 dosis documentadas

GUÍA DE ARIZONA A LAS VACUNAS REQUERIDAS PARA ENTRAR - Intervalo Mínimo / Programa de Recuperación Guardería, Centro Preescolar o Head Start (Año Escolar 2023-2024)



- Un niño al que le faltan las vacunas requeridas para su edad debe recibir una dosis de las vacunas necesarias dentro de los 15 días de la inscripción; después de 15 días, el niño no puede asistir sin documentación de que ha recibido las vacunas requeridas.

Vacuna	Dosis #	Edad Mínima	Intervalo Mínimo Entre Dosis	Notas
HepB Hepatitis B	Dosis 1	Nacimiento	Al menos 4 semanas entre la dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> • La dosis final de la vacuna HepB debe administrarse a las 24 semanas de edad o más. Si la dosis 3 de HepB se administró antes de las 24 semanas de edad, se requiere una cuarta dosis. • Algunos niños pueden recibir una dosis al nacer y luego una vacuna combinada que da como resultado un total de 4 (o más) dosis. Siempre que se cumplan los intervalos mínimos entre las dosis y la recepción de la dosis final a las 24 semanas de edad o más, 4+ dosis cumplen el requisito.
	Dosis 2	4 semanas	Al menos 8 semanas entre dosis 2 y 3 (o final)	
	Dosis 3	24 semanas	Al menos 16 semanas entre la dosis 1 y 3 (o final) Y a / después de las 24 semanas de edad	
DTaP Difteria, tétanos y tos ferina	Dosis 1	6 semanas	Al menos 4 semanas entre la dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> • Un niño puede recibir una dosis de DTaP a los 4 años de edad o después; aunque no se requiere para asistir a cuidado infantil / preescolar, esta dosis generalmente se administra en preparación para asistir al jardín de infantes. La edad mínima para la dosis final (# 4 o # 5) es de 4 años y al menos 6 meses desde la dosis anterior.
	Dosis 2	10 semanas	Al menos 4 semanas entre la dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	Al menos 6 meses entre la dosis 3 y 4	
	Dosis 4	12 meses	-	
Hib Haemophilus Influenzae tipo B	Dosis 1	6 semanas	Al menos 4 semanas entre la dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> • Si las 3 dosis administradas son PedvaxHib, solo necesita 3 dosis en total; La dosis 3 debe ser a los 12 meses de edad o después. • Se requiere una dosis de Hib a los 12 meses o después para todos los niños menores de 5 años. • Solo se requiere una dosis si la primera / única dosis se administra a los 15 meses de edad o después. • Hib no se administra después de los 5 años de edad a menos que el niño tenga una condición médica.
	Dosis 2	10 semanas	Al menos 4 semanas entre la dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	Al menos 8 semanas entre la dosis 3 y 4	
	Dosis 4	12 meses	-	

Vacuna	Dosis #	Edad mínima	Intervalo Mínimo Entre Dosis	Notas
Polio IPV u OPV	Dosis 1	6 semanas	Al menos 4 semanas entre la dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> Solo se requieren 3 dosis para ingresar al jardín de infantes si la tercera dosis se recibió al cumplir los 4 años del niño o después y al menos seis meses después de la segunda dosis. Se presumirá que la OPV administrada antes del 1 de abril de 2016 es trivalente y, por lo tanto, aceptable, independientemente del país de administración. Se presume que cualquier dosis de OPV administrada a partir del 1 de abril de 2016 es bivalente y, por lo tanto, inaceptable. (Los EE. UU. Actualmente no administrar nada más que IPV (vacuna antipoliomielítica inactivada), mientras que algunos países extranjeros todavía administran la OPV (vacuna antipoliomielítica oral).
	Dosis 2	10 semanas	Al menos 4 semanas entre la dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	Al menos 6 meses entre la dosis 3 y 4	
	Dosis 4	4 años	-	
MMR Sarampión, Paperas y rubéola	Dosis 1	12 meses	Al menos 4 semanas entre la dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> La primera dosis de rutina se administra entre los 12 y 15 meses Si viaja, CDC recomienda una dosis a partir de los 6 meses de edad. Será necesario administrar otra dosis entre 12 y 15 meses, al menos 28 días después de la dosis 1. Consulte Plan de viaje Sarampión (Rubéola) CDC Si la dosis 1 de MMR se administró más de 4 días antes del primer cumpleaños, se requiere otra dosis. Debe recibir el mismo día que la varicela o con al menos 28 días de diferencia (esta regla también se aplica a las dosis de influenza nasal viva).
	Dosis 2	13 months	-	
VAR Varicela (chickenpox)	Dosis 1	12 meses	-	<ul style="list-style-type: none"> Si la dosis 1 de varicela se administró más de 4 días antes del primer cumpleaños, se requiere otra dosis. Debe recibir el mismo día que la vacuna triple viral o al menos con 28 días de diferencia (esta regla también se aplica a las dosis de influenza nasal viva).
HepA Hepatitis A	Dosis 1	12 meses	Al menos 6 meses entre la dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> Si la dosis 1 de HepA se administró más de 4 días antes del primer cumpleaños, se requiere otra dosis. Los niños de 1 a 5 años deben obtener la dosis 1 dentro de los 15 días posteriores a la inscripción en el cuidado infantil, preescolar o Head Start. La dosis 2 vence 6 meses después de la dosis 1.
	Dosis 2	18 meses	-	